

Die Ausgangsstoffe sind gemäß EU-Öko-Verordnung 834/2007 einsetzbar



PhytoGreen® -Banane

Organisch-mineralische NPK-Dünger-Lösung
mit Ca, Mg, S und micronisierten Spurenelementen

Bio-Flüssigdünger zur optimalen Nährstoffversorgung von Bananenstauden!

made
in
Germany

Die Produktwirkstoffe:

- 3 % N (org. Stickstoff)
- 3 % P₂O₅ (Phosphat)
- 4 % K₂O (Kaliumoxid)

Die Vorteile:

Organisch-mineralischer Spezialdünger mit an die Bedürfnisse dieser Pflanze angepasster Nährstoff-Kombination.

Die Haupt- und Spurennährstoffe sind:

- ◆ natürlicher Herkunft
- ◆ sofort pflanzenverfügbar

Mit Meeresalgen:

- ◆ zur Vitalisierung der Pflanzen
- ◆ für gesundes Wurzelwachstum
- ◆ zur Aktivierung der Mikroorganismen

Mit Proteinen und Vitaminen:

- ◆ für rundum gut versorgte Pflanzen

Sehr sparsam, weil optimal konzentriert!

Hinweise:

Mischbarkeit:

PhytoGreen®-Banane ist mit den gängigen Pflanzenbehandlungsmitteln mischbar. Da jedoch nicht alle in der Praxis auftretenden Zufälle voraussehbar sind, ist in jedem Fall ein Mischversuch mit kleinen Mengen der für die Spritzung vorgesehenen Produkte zweckmäßig.

Verpackungsgrößen:

0,5 ltr. • 10 ltr. • 200 ltr. • 1000 ltr.

Spezial-Formulierung:

1 % Calcium; 0,2 % Magnesium; 0,15% Schwefel; 0,0001 % Bor; 0,1 % Cu; 0,5 % Eisen; 0,12 % Mangan; 0,2 % Zink.

Mit Meeresalgen, weiteren natürlichen Nährstoffe wie Na, Mo, Si, mit Kohlenhydraten, Fettsäuren, Aminosäuren, Vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E und K, Auxine und andere Phytohormone.

Anwendungsempfehlung:

Von März bis September alle vierzehn Tage:

März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt

Auf das Blatt: 5-10 ml in 1 ltr. Spritzwasser

Über den Boden: 20-30 ml in 1 ltr. Gießwasser

Junge Bananenstauden vorzugsweise nach der Ruhezeit düngen, um Knospenbildung und Triebe anzuregen:

Auf das Blatt: 10-20 ml in 1 ltr. Spritzwasser

Über den Boden: 30-40 ml in 1 ltr. Gießwasser

Die Anwendung über das Blatt ist besonders effektiv. Diese führt allerdings zu einem sichtbaren Spritzbelag, der bei Anwendung über den Boden vermieden wird.

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden (Ansprüche der Kultur und Bodenanalyse beachten). Empfohlene Aufwandmengen nicht überschreiten. Nur trockene Blätter behandeln. Einwirkungsdauer: mind. 2 Stunden vor Beregnung oder Niederschlag.

Lagerung und Haltbarkeit:

Bei Lagerung zwischen 4 °C und 25 °C im Originalgebinde mindestens zwei Jahre haltbar.