

Die Ausgangsstoffe sind gemäß EU-Öko-Verordnung 834/2007 einsetzbar



# PhytoGreen®-Tomate

Organisch-mineralische NPK-Dünger-Lösung  
mit Calcium und micronisierten Spurenelementen

Mit 10% Calcium

Der optimale Tomatendünger mit extra viel Calcium. Calcium hilft Braunfäule vorzubeugen. Zum Wohl Ihrer Pflanzen!



## Die Produktwirkstoffe:

- 3 % N (org. Stickstoff)
- 4 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Phosphat)
- 3 % K<sub>2</sub>O (Kaliumoxid)

## Die Vorteile:

Organisch-mineralischer Spezialdünger mit an die Bedürfnisse dieser Pflanze angepasster Nährstoff-Kombination.

### Die Haupt- und Spurennährstoffe sind:

- ◆ natürlicher Herkunft
- ◆ sofort pflanzenverfügbar

### Mit Meeresalgen:

- ◆ zur Vitalisierung der Pflanzen
- ◆ für gesundes Wurzelwachstum
- ◆ zur Aktivierung der Mikroorganismen

### Mit Proteinen und Vitaminen:

- ◆ für rundum gut versorgte Pflanzen

Sehr sparsam, weil optimal konzentriert!

## Hinweise:

### Mischbarkeit:

PhytoGreen®-Tomate ist mit den gängigen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Da jedoch nicht alle in der Praxis auftretenden Zufälle voraussehbar sind, ist in jedem Fall ein Mischversuch mit kleinen Mengen der für die Spritzung vorgesehenen Produkte zweckmäßig.

### Verpackungsgrößen:

0,5 ltr. • 10 ltr. • 200 ltr. • 1000 ltr.

## Spezial-Formulierung:

10,2 % Calcium; 0,5 % Eisen; 0,2 % Magnesium; 0,1 % Mangan; 0,0001 % Bor; 0,1 % Kupfer; 0,15 % Schwefel; 0,2 % Zink.

Mit Meeresalgen, weiteren natürlichen Nährstoffen wie Na, Mo, Si; enthält Kohlenhydrate, Fettsäuren, Vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E und K, Auxine und andere Phytohormone.

## Anwendungsempfehlung

### Tomaten, Paprika und Chili:

März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt

### Auf das Blatt:

10-20 ml in 1 ltr. Spritzwasser

### Über den Boden:

20-30 ml in 1 ltr. Gießwasser

Die Anwendung über das Blatt ist besonders effektiv. Diese führt allerdings zu einem sichtbaren Spritzbelag, der bei Anwendung über den Boden vermieden wird.

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. (Ansprüche der Kultur und Bodenanalyse beachten). Empfohlene Aufwandmengen nicht überschreiten. Nur trockene Blätter behandeln. Einwirkungsdauer: mind. 2 Stunden vor Beregnung oder Niederschlag.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Bei Lagerung zwischen 4 °C und 25 °C im Originalgebinde mindestens zwei Jahre haltbar.

