



## Blattanalysen


ermöglichen eine genaue Bestimmung des Ernährungszustandes Ihrer Kultur. Insbesondere vor der Gabe von Mikronährstoffen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), die von der Pflanze nur in geringen Mengen benötigt werden, empfehlen wir daher, eine Blattanalyse durchführen zu lassen. Kosten hierfür können rückvergütet werden!

Die PHYTOsolution arbeitet eng mit dem Institut für **A**grar- und **U**mweltanalytik in Freyburg zusammen. Das IAU kann Blattproben innerhalb kurzer Zeit analysieren und bewerten.

### Einfache Probenahme:

In der Blüte über die Anlage verteilt an 20-30 verschiedenen Stellen insgesamt 300-500 g voll entwickelte Blätter aus der Mitte der Pflanze einsammeln. Keine Proben entnehmen, wenn in den vorangegangenen 3-5 Tagen der Bestand mit Pflanzenschutzmitteln oder Nährstoffen behandelt wurde. Blätter zusammen mit einem Analysenauftragsformular zum Labor schicken. Kontaktieren Sie uns!

## Pflanzenernährung | Erdbeeren



PHYTOsolution  
Querfurter Str. 9  
06632 Freyburg

Tel.: +49 (0) 34464 / 61044  
Fax: +49 (0) 34464 / 61043

Ihr kompetenter Partner für alle Fragen der Pflanzenversorgung.

info@phytosolution.de  
www.phyotosolution.de



**PHYTO solution**

... Pflanzenernährung mit System

info@phytosolution.de  
www.phyotosolution.de



**PHYTO solution**

... Pflanzenernährung mit System

# Anwendungsempfehlungen für Erdbeeren



## Ziel der Behandlung



Stadium	Pflanzung	Blattentwicklung	Blütenanlagen	Blüte	Fruchtentwicklung	Fruchtreife	nach der Ernte
BBCH		10-19	55-59	60-67	71-73	81-85	91-92
<b>Standardanwendungen</b>							
Anwachsen, Wurzelbildung	7-10 Tage nach dem Pflanzen mit 20-30 l <b>Vigosol*</b> /ha angießen.	0,5 l/ha <b>PhytoGreen®-Booster/ BioBooster*</b> (Amino- und Huminsäuren + Meeresalgen)			0,5 l/ha <b>PhytoGreen®-Booster/ -BioBooster*</b> (Amino- und Huminsäuren + Meeresalgen)		
Verbesserung der Effektivität und Verträglichkeit von Pflanzenschutzmaßnahmen		50 ml <b>PhytoGreen®-pH Total</b> oder <b>CARBO-ECO pH*</b> / 100 l Spritzbrühe; 1-2 l/ha <b>Plantosol®*</b> (9% N, tier. Aminosäuren)/ <b>Bio-Plantosol®*</b> (4% N, pflanzl. Aminosäuren) zum Pflanzenschutz					
Widerstandskraft gegen Pilzkrankheiten		1-2 mal 2-3 l/ha <b>ASKAPHY27</b> (NK-Dünger mit phosphoriger Säure), ab Vorblüte 2-3 mal 1 l/ha <b>BlackHum</b> (Huminsäuren) oder ab Blühbeginn 2 mal 2-3 l/ha <b>PhytoGreen®-Algensaft*</b> oder Einsatz der <b>SmartCropTechnology</b> - Kombi aus fermentativen Mikroorganismen und Pflanzenextrakten - siehe hierzu gesonderte Info					Bandbehandlung mit 10-15 l/ha <b>ASKAPHY27</b> (NK-Dünger mit phosphoriger Säure)
Bor-Versorgung, guter Fruchtansatz		1 l/ha <b>PhytoGreen®-Bor*</b> (150 g B/l) oder <b>PhytoGreen®-Calciumborat</b> (101 g B und 173 g Ca/l)					gegebenenfalls Wiederholung der Anwendung
Eisen-Versorgung		1-2 mal 3-5 l/ha <b>PhytoGreen®-EisenCarboxylat</b> bzw. <b>CARBO-ECO Fe*</b> (wasserlösliche Carboxylate mit 58 g Fe/l)					
Förderung der Fruchtausfärbung und -qualität					3 x 2 l/ha <b>PhytoGreen®-FruitColour</b> (PK-Düngerlösung) ab 8 Tage vor Erntebeginn		
<b>Zusatzanwendungen (vorzugsweise nach Blattanalyse - Ergebnis innerhalb von 3 Werktagen - sprechen Sie uns an!)</b>							
Zink-Versorgung, hohe Wuchskraft, Winterhärte		1 l/ha <b>PhytoGreen®-Zink*</b> (Suspension, 700 g Zn/l) oder 3-4 l/ha <b>PhytoGreen®-ZinkCarboxylat</b> bzw. <b>CARBO-ECO Zn*</b> (wasserlösliche Carboxylate, 58 g Zn/l)					gegebenenfalls Wiederholung der Anwendung
Mangan-Versorgung				1 l/ha <b>PhytoGreen®-Mangan27*</b> (Suspension, 500 g Mn/l) oder 2 l/ha <b>PhytoGreen®-ManganCarboxylat</b> bzw. <b>CARBO-ECO Mn*</b> (wasserlösliche Carboxylate, 58 g Mn/l) oder 2 l/ha <b>PhytoGreen®-ManganNitrat</b> (235 g Mn/l)			
Calcium-Versorgung, Fruchtfestigkeit, Lagerstabilität				2-3 mal 4 l/ha <b>PhytoGreen®-CalciumCarboxylat</b> (130 g Ca/l) oder <b>CARBO-ECO Ca*</b> (49 g Ca/l)			
Magnesium-Versorgung				2-3 mal 4 l/ha <b>PhytoGreen®-Mg500</b> (Suspension mit 300 g Mg/l) oder 2-3 mal 5 l/ha <b>PhytoGreen®-MagnesiumCarboxylat</b> bzw. <b>CARBO-ECO Mg*</b> (wasserlösliche Carboxylate mit 70 bzw. 35 g Mg/l)			

\*Die Ausgangsstoffe sind gemäß EU-Öko-Verordnung 834/2007 einsetzbar und als Betriebsmittel bei FIBL und InfoXgen gelistet oder von der BCS GmbH zertifiziert.

**Blattdünger können generell mit dem Pflanzenschutz kombiniert werden.**