

PhytoGreen®-Calciumborat

EG-DÜNGEMITTEL BORDÜNGERSUSPENSION (CALCIUMBORAT)

Suspension auf der Basis von Calciumborat zur **Versorgung mit Bor und Calcium** für eine kräftige Jugendentwicklung, zur Vorbereitung der Winterruhe und für hohe Frosthärte.

Die Produktwirkstoffe

7 % Gesamt-Bor (101 g B/l)
12 % Calciumoxid (173 g CaO/l)

Dichte: 1,44 kg/l; pH = 7,5

PhytoGreen®-Calciumborat enthält neben Bor auch den Nährstoff Calcium zur Unterstützung des Zellwandaufbaus.

Die neue „Borgeneration“ wirkt gleichmäßig über einen längeren Zeitraum als Borethanolamin, ist damit effektiver

Anwendungsempfehlung:

Allgemein:

Zur Borversorgung: 1-3 l/ha bei Blattdüngung in 200-400 l Wasser, 4-8 l/ha bei Bodendüngung.

Erdbeeren:

Für eine gute Blüte, für hohen Fruchtansatz und gegen verformte Beeren: über das Blatt 1 l/ha im Stadium grüne Knospe, 2 l/ha im Herbst.

Wein:

Für eine gute Blüte, für Fruchtansatz und gleichmäßigere Gescheine: 2 Blattanwendungen mit 1 l/ha ab Vergrößern der Gescheine.

Steinobst:

Für gute Blüte und hohen Fruchtansatz: 1 l/ha ab Anfang Blüte und 2 l/ha nach der Ernte über das Blatt.

Kernobst:

Für eine gute Blüte, für Fruchtansatz und Schalenqualität: je 1 l/ha im Stadium Rote Knospe, Ballonstadium und Abblüte; 2 l/ha nach der Ernte über das Blatt.

Mais:

Für Pollenqualität, Kornansatz: 3 l/ha ab 4 bis 10-Blattstadium über das Blatt.

und verträglicher. PhytoGreen®-Calciumborat enthält 101 g B/l und kann in den gleichen Konzentrationen wie bisher gängige Borethanolamin-Dünger mit 150 g B/l eingesetzt werden.

PhytoGreen®-Calciumborat wird im Gegensatz zu Borethanolamin ohne den Einsatz von Aminoalkohol hergestellt.

Blatt- und Kohlgemüse:

Für innere Qualität, gegen Herznekrose: 2-3 l/ha sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist als Blattdüngung.

Wurzel- und Fruchtgemüse:

Für guten Fruchtansatz: 2-3 l/ha über das Blatt sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist.

Kartoffeln:

Für innere Qualität: 1 -2 mal 1 l/ha ab Reihenschluss über das Blatt.

Raps:

Für gleichmäßige Blüte und Abreife, Ertrag: über das Blatt 3 l/ha im Herbst ab 4 bis 6-Blattstadium, bei starkem Mangel im Frühjahr wiederholen.

Zuckerrüben:

Gegen Herz- und Trockenfäule: 1 -2 mal 3 l/ha ab 4 bis 6-Blattstadium über das Blatt.

Hinweise:

Mischbarkeit:

PhytoGreen®-Calciumborat ist nicht mit Phosphaten und Sulfaten mischbar.

Verpackungsgröße: 10 ltr.